

Контакт: Laina Mitchell
Электронная почта: lmitchell@granthealth.org
Телефон: 509-766-7960 ДОБ. 30

ДЛЯ ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Декабрь, 16 2022 г.

Предупреждение для поставщиков: дефицит осельтамивира (тамифлю) и инструменты управления им
Руководство и ресурсы, помогающие справиться с нехваткой осельтамивира (Тамифлю).

Округ Грант, штат Вашингтон - Руководитель службы здравоохранения округа Грант, доктор Александр Брезни, выпустил следующее предупреждение, чтобы уведомить медицинское сообщество округа Грант о потенциальной и существующей нехватке осельтамивира (Tamiflu®) в сезон тяжелого гриппа 2022-2023 гг. Значительный рост заболеваемости гриппом по всей стране способствовал нехватке осельтамивира (Тамифлю®) и других распространенных лекарств. Прививка от гриппа и другие стратегии профилактики гриппа крайне важны для снижения нагрузки на системы здравоохранения и борьбы с нехваткой осельтамивира. Медицинские учреждения должны продолжать проводить политику профилактики гриппа и учитывать при лечении пациентов следующие рекомендации, предоставленные Департаментом здравоохранения штата Вашингтон:

Рекомендации -

1. Использование осельтамивира в целях химиопрофилактики не рекомендуется за редким исключением (например, при вспышке гриппа в LTCF).
2. Лечение гриппа осельтамивиром рекомендуется для следующих групп населения:
 - a. Госпитализированные пациенты любого возраста с подтвержденным или подозреваемым гриппом и симптомами респираторного заболевания.
 - b. Пациенты с подтвержденным или подозреваемым* гриппом с повышенным риском декомпенсации/осложнений в течение 48 часов после появления симптомов или в течение 5 дней, если симптомы прогрессируют. К ним относятся следующие группы:
 - i. Дети младше 2 лет и взрослые в возрасте 65 лет и старше
 - ii. Хронические заболевания
 1. Астма, ХОБЛ или другие хронические респираторные заболевания
 2. Тяжелые заболевания почек и печени

3. Плохо контролируемый диабет или нарушения обмена веществ (например, наследственные нарушения обмена веществ или митохондриальные нарушения)

4. История сердечных заболеваний и/или инсульта

5. Неврологические и нейроразвивающие заболевания

6. Морбидное ожирение (ИМТ \geq 40)

7. Активная злокачественная опухоль/гематологическое заболевание

8. Тяжело ослабленный иммунитет

iii. Жители домов престарелых и учреждений длительного ухода

iv. Беременные (до 2 недель после родов)

3. Не рекомендуется использовать более высокие дозы осельтамивира (более 75 мг на дозу) для лечения сезонного гриппа; рекомендуемая продолжительность противовирусного лечения составляет 5 дней для осельтамивира.

4. Пероральный суспензионный препарат следует использовать только для педиатрических пациентов, не способных принимать таблетки.

a. Если пероральная суспензия недоступна, можно вскрыть капсулы и смешать их с густой подслащенной жидкостью**.

b. Капсулы для перорального приема выпускаются в дозировках 30, 45 и 75 мг. Обеспечьте соответствующее дозирование в зависимости от веса.

5. Альтернативы для амбулаторного лечения (ингаляционный занамивир, внутривенный перамивир или пероральный балоксавир) могут быть рассмотрены для амбулаторного лечения. Существующие ограниченные данные свидетельствуют о том, что пероральный балоксавир эффективен как для лечения неосложненного гриппа, так и для постконтактной профилактики. Рассмотрение альтернативных противовирусных препаратов для госпитализированных пациентов должно проводиться в сочетании с консультацией специалиста. Перед выбором и назначением альтернативного противовирусного препарата обязательно ознакомьтесь с разрешенными возрастными группами, противопоказаниями и любыми применимыми рекомендациями по почечной/печеночной дозировке.

Эти рекомендации предназначены для руководства, но не заменяют клиническую оценку, консультации экспертов или другие признанные руководства (например, IDSA, AAP и CDC).

ИСТОЧНИК: Департамент здравоохранения штата Вашингтон

Усилия GCHD по оказанию помощи во время локальной нехватки -

Если в вашем учреждении дефицит достигает уровня, угрожающего безопасности пациентов, осельтамивир может быть запрошен из государственных и федеральных стратегических национальных запасов (SNS) через GCHD. В GCHD поступило первоначальное распределение осельтамивира для снабжения учреждений, испытывающих его нехватку. Пожалуйста, свяжитесь с GCHD для получения осельтамивира в случае необходимости.

Резюме: Медицинские учреждения должны продолжать поощрять вакцинацию против гриппа среди подходящих пациентов и изучить рекомендации по лечению гриппа. В GCHD имеется ограниченный запас осельтамивира, но есть возможность заказать еще. Местные медицинские учреждения, столкнувшиеся с нехваткой осельтамивира, должны связаться с GCHD. Напоминаем, что при работе с пациентами, у которых наблюдаются симптомы гриппоподобного заболевания, мы рекомендуем медицинским работникам носить маску N95.

Ресурсы:

<https://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/summary-clinicians.htm>

<https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/4/e2021053744/183303/Recommendations-for-Prevention-and-Control-of?autologincheck=redirected>

<https://www.idsociety.org/practice-guideline/influenza/>

<https://doh.wa.gov/>
