

**PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
6/12/2024**

Para: Grant Co Media

**PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN
CONTACTO CON**Lexi Smith
Oficial de Información Pública
(509) 770-4194
lsmith@granthealth.org

Residente del Condado de Grant muere de Hantavirus

CONDADO DE GRANT, WA – El Distrito de Salud del Condado de Grant (GCHD, por sus siglas en inglés) confirmó recientemente que un residente del Condado de Grant en sus 20 años murió a causa del Hantavirus. El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Washington (DOH, por sus siglas en inglés) informó a GCHD del resultado positivo del laboratorio el 10 de junio de 2024. El individuo había tenido una exposición conocida a roedores antes de su enfermedad, probablemente dentro de un vehículo. El último caso confirmado de Hantavirus en el condado de Grant ocurrió en 2019. Este es el sexto caso de Hantavirus en el Condado de Grant en los últimos 20 años.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de uno de los miembros de nuestra comunidad debido al Hantavirus. Nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de esta persona", afirma el Dr. Alexander Brzezny, Oficial de Salud del Condado de Grant.

Acerca del Hantavirus - El síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad poco frecuente, pero a veces mortal, causada por un virus que se encuentra en la orina, los excrementos y la saliva de roedores infectados. En el estado de Washington, los ratones ciervos son los portadores del virus.

Las personas se enferman con hantavirus al respirar polvo contaminado de orina fresca, excrementos o nidos de roedores infectados. El mayor riesgo ocurre en áreas cerradas, como cobertizos, cabañas o vehículos, con infestación de roedores y mala circulación de aire. Las personas también pueden infectarse cuando tocan objetos contaminados con el virus y luego se tocan la nariz o la boca. No se puede transmitir de una persona a otra.

Síntomas del antavirus: la enfermedad generalmente comienza de una a seis semanas después de la exposición. Los primeros signos incluyen síntomas leves similares a los de la gripe, como:

1. Fiebre
2. Dolores musculares

3. Fatiga
1. Dolores de cabeza
2. Mareos
3. Escalofríos
4. Problemas abdominales como náuseas, vómitos, diarrea o dolor de estómago

De cuatro a 10 días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los síntomas tardíos del HPS.

Estos incluyen tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho debido al líquido que llena los pulmones. La hospitalización suele ser necesaria, y un poco más de un tercio de los casos resultan en la muerte.

Prevenir el Hantavirus - GCHD recomienda lo siguiente cuando limpie áreas donde pueda haber ratones muertos y otros roedores:

1. Ventile el espacio antes de limpiarlo abriendo puertas y ventanas durante al menos 30 minutos.
2. Evite levantar polvo; No use un soplador de hojas, una aspiradora, una escoba ni métodos de limpieza como el polvo en seco.
3. Use guantes de goma, látex, vinilo o nitrilo (caucho sintético).
4. Humedece bien cualquier área contaminada, incluidos roedores, excrementos y nidos atrapados o muertos, con una solución de cloro al 10%.
 1. *A continuación le explicamos cómo hacerlo:*
 1. *Mezcle 1 1/2 tazas de cloro doméstico en 1 galón de agua fría (o 1 parte de cloro por 9 partes de agua). Haga esta solución fresca antes de cada uso.*
 2. *Use una botella rociadora para rociar el área afectada con cloro y solución de agua hasta que esté muy húmeda. Deje remojar durante 5-10 minutos.*
 3. *Use toallas de papel o trapos que se puedan desechar para recoger o limpiar roedores, material de nido, ratones y/o excrementos, y/u orina.*
 4. *Trapea o esponja el área con la solución de cloro.*
1. Coloque los trapos sucios y los roedores muertos en una bolsa doble y colóquelos en un bote de basura sellado.
2. Lave los guantes con desinfectante o agua y jabón antes de quitárselos, luego lávese las manos con agua y jabón después de quitarse los guantes.

Infestación de roedores en vehículos : los roedores pueden ingresar a los vehículos a través de orificios de óxido, respiraderos y otras aberturas. Una vez dentro, pueden construir nidos en los compartimentos del motor, los conductos y los componentes de filtración de aire, los maleteros, los compartimentos de las llantas de repuesto, las guanteras, etc. Si sospecha que un vehículo puede estar infestado de ratones, protéjase del hantavirus tomando las siguientes medidas:

1. Antes de inspeccionar el vehículo, abra todas las puertas y el compartimiento del motor para ventilarlo durante al menos 30 minutos. No arranque el vehículo.

2. Con guantes y una camisa de manga larga, inspeccione cuidadosamente el vehículo en busca de material de nidos de roedores, excrementos y roedores muertos.
3. Remoje las áreas del vehículo donde haya encontrado excrementos y materiales de nidos con la solución de cloro descrita anteriormente.
4. Use toallas de papel para recoger cualquier material de nidos o excrementos y deseche los desechos en un contenedor de basura sellado al aire libre. No aspire, barra ni quite el polvo.
5. Para obtener información más detallada sobre la limpieza de vehículos infestados de roedores, haga clic en el enlace: [Cleaning-infested vehicles from Public Health – Seattle & King County.](#)

Infestaciones intensas de roedores: se deben tomar precauciones especiales para limpiar áreas con infestaciones intensas de roedores (es decir, excrementos apilados, numerosos nidos o roedores muertos). Los propietarios de viviendas deben considerar la posibilidad de contratar a una empresa profesional para limpiar las zonas muy contaminadas.

Mantenga a los roedores fuera de su entorno: mientras los pasos anteriores minimizarán el riesgo de exposición, **la mejor manera de prevenir el hantavirus es el control de roedores.** Tenga en cuenta lo siguiente para ayudar a mantener a los roedores fuera de su espacio:

1. Selle los agujeros y huecos de su casa, garaje o vehículos.
2. Coloque trampas dentro y alrededor de su casa.
3. Limpia cualquier alimento fácil de conseguir que pueda atraer a los roedores.
4. Retira sus lugares para esconderse cerca de tu casa, como pilas de madera y colecciones de basura

Qué hacer si está expuesto a roedores - No existe una prueba para determinar si ha estado expuesto al hantavirus. Solo se puede detectar en un análisis de sangre una vez que aparecen los síntomas. Si ha estado expuesto a roedores, debe vigilarse para detectar síntomas hasta ocho semanas después de la exposición. Si aparecen síntomas, busque atención médica e informe a su proveedor de atención médica sobre la exposición a roedores.

Recursos - Haga clic en los enlaces para obtener más información sobre los siguientes temas:

[How to Clean Up After Rodents](#)

[Hantavirus | Washington State Department of Health](#)

[More about Hantavirus - CDC](#)

###
